

# ACIAMIN

60 compresse laccate deglutibili da 1200 mg



## FASE POST ACUTA

Interventi chirurgici  
Ustioni - Traumi  
Infezioni  
Decubiti chirurgici

## NEOPLASIA (oncologia)

Calo peso e/o chemioterapia  
e/o radioterapia  
Cachessia oncologica

## TONIFICANTE

Antiastenico  
Recupero post-traumatico  
Cardiopatie scompenso cardiaco  
Deficit nutrizionali sistemi dietetici

## INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Componenti	Per cpr da 1200mg	Per 100 g
L-Leucina	250 mg	20,8 g
L-Carnitina	150 mg	12,5 g
L-Lisina	125 mg	10,4 g
L-Isoleucina	125 mg	10,4 g
L-Valina	125 mg	10,4 g
L-Treonina	70 mg	5,83 g
L-Cistina	30 mg	2,5 g
L-Istidina	30 mg	2,5 g
L-Fenilalanina	20 mg	1,67 g
L-Metionina	10 mg	0,83 g
L-Tirosina	6 mg	0,5 g
L-Triptofano	4 mg	0,33 g
Cromo	50 mcg(*)	4,16 g

(\*) pari al 125% di VNR

**ACIAMIN** contiene tutti gli aminoacidi essenziali in grado di riattivare la sintesi di proteine muscolari e plasmatiche e di sostenere le capacità di difesa dell'organismo in soggetti con malnutrizione associata a patologie in fase post-acuta.

## IMPIEGO:

Aciamin Smp è consigliato nei casi di sarcopenia; coadiuvante farmacologico nelle malattie croniche (cardiovascolari - diabetiche); tonico ricostituente; riabilitazione dei traumi scheletrici per un recupero più rapido; nelle diete ipocaloriche, e cachessia neoplastica.

## AVVERTENZE:

non assumere il prodotto in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza o allattamento. Conservare in luogo fresco ed asciutto ed evitare l'esposizione ai raggi solari. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni. Contiene fenilalanina.

## MODALITÀ D'USO:

si consiglia di assumere fino ad un massimo di 4 compresse al giorno da deglutire senza masticare con abbondante acqua. Si consiglia l'assunzione del prodotto durante i pasti principali.